



REPUBLICA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT Arkivi Qendror - Centralno Arhivo - Central Archive
Nr./Br./No. <u>1494</u>
Nr. i fq./Br Str./No. pg. <u>3+3+3</u>
Data/Datum/Date: <u>07.04.2023</u>
PRISTINE PRISTINA PRISTINA

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministririt / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datë: 06.04.2023
Ref. KM-146/23

Në mbështetje të nenit 145 (paragrafi 2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funkcionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare, Nr. 7/ 01 mars 2019), duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 1.4) neni 15, Shtojca 11 të Rregullores (QRK)-Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (30.03.2021), dhe Nenin 20 (paragrafët 1, 4 dhe 5) të Ligjit Nr. 03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, (Gazeta Zyrtare Nr. 44, datë 22.12.2008) si dhe në bazë të rekomandimit të Komisionit për vlerësim dhe autorizim të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve, me Ref.04-207/23, të datës 28.03.2023, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerrë:

VENDIM

Për futjen në regjistër dhe lejimin e autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve për përdorim

1. Lejohet importimi, vendosja në treg dhe përdorimi i autorizimit të produktit për mbrojtjen e bimëve – **Minecto Alpha 10/1.25 SC** prodhuesit “**Syngenta Crop Protection AG**”, Zvicer nga përfaqësuesi i saj “**Fitofarma**” SH.P.K, Ferizaj.

2. LLOJI I PRODUKTIT: Insekticid

3. PËRMBAJTJA E SUBSTANCËS AKTIVE: Cyantraniliprole.....100g/l
Acibenzolar-S-Methyl.....12.5gr/l

4. PËRDORIMI:

Marule (FH):

a) Për kontrollin e Tripsit (*Frankliniella occidentalis*) me dozë 100 ml/dynym (max) ose 100 ml/100 litra ujë. **Spërkatje gjethore** nga shfaqja e gjethes së 2^{-të} të vërtetë, deri sa kokat të arrijnë madhësinë e tyre tipike (BBCH 12-49). Një trajtim çdo 2 vjet.

b) Për kontrollin e Lepidoptereve (*Spodoptera sp.*) me dozë 75 ml/dynym (max) ose 75 ml/100 litra ujë. **Spërkatje gjethore** nga shfaqja e gjethes së 2^{-të} të vërtetë, deri sa kokat të arrijnë madhësinë e tyre tipike (BBCH 12-49). Një trajtim çdo 2 vjet.

c) Për kontrollin e Tripsit (*Frankliniella occidentalis*), dhe Lepidoptereve (*Spodoptera sp.*) me dozë 100 ml/dynym (max) dhe me 1-2 m³ ujë/dynym. **Nëpërmjet ujitjes me pika** nga shfaqja e gjethes së 2^{-të} të vërtetë, deri sa kokat të arrijnë madhësinë e tyre tipike (BBCH 12-49). Një trajtim çdo 3 vjet.

Domate (S), Patlixhan (S): Për kontrollin e Tripsit (*Frankliniella occidentalis*), Krahëbardhave (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), Lepidoptereve (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera litoralis*, *Heliothis armigera*), Tutës (*Tuta absoluta*), Liriomizës (*Liriomyza* spp).

Dozat: a) 100 ml/dynym (max) ose 100 ml/100 litra ujë. **Spërkatje gjethore** nga shfaqja e 9 ose më shumë gjetheve në kërcellin kryesor deri sa frutat të marrin ngjyrën tipike të pjekjes për varietetin e tyre (BBCH 20-89). Një trajtim në vit.

b) me dozë 60-75 ml/dynym (max) dhe me 1-2 m³ ujë/dynym. **Nëpërmjet ujitjes me pika** nga shfaqja e gjethes së 2^{-të} në kërcellin kryesor deri sa frutat të marrin ngjyrën tipike të pjekjes për varietetin e tyre (BBCH 12-89). Një trajtim çdo 3 vjet.

Kungull (S), Pjepër (S), Shalqi (S): Për kontrollin e Tripsit (*Frankliniella occidentalis*), Krahëbardhave (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), Lepidoptereve (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera litoralis*, *Heliothis armigera*), Morrave (*Aphis gossypii*).

Dozat: 100 ml/dynym (max) ose 100 ml/100 litra ujë.

Spërkatje gjethore nga shfaqja e 9 ose më shumë gjetheve në kërcellin kryesor derisa frutat të arrijnë madhësinë tipike të vjeljes / ngjyrën tipike të pjekjes për varietetin e tyre (BBCH 20-89). Një trajtim në vit.

Kungull (S), Pjepër (S), Shalqi (S), Kastravec (S): Për kontrollin e Tripsit (*Frankliniella occidentalis*), Krahëbardhave (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), Lepidoptereve (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera litoralis*, *Heliothis armigera*), Morrave (*Aphis gossypii*).

Dozat: 60-75 ml/dynym (max) dhe me 1-2 m³ ujë/dynym.

Nëpërmjet ujitjes me pika nga shfaqja e gjethes së 2^{-të} të vërtetë në kërcellin kryesor deri sa frutat të arrijnë madhësinë tipike të vjeljes / ngjyrën tipike të pjekjes për varietetin e tyre (BBCH 12-89). Një trajtim çdo 3 vjet.

Spec (S): Për kontrollin e Tripsit (*Frankliniella occidentalis*), Krahëbardhave (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), Lepidoptereve (*Spodoptera exigua*, *Spodoptera litoralis*, *Heliothis armigera*), Liriomizës (*Liriomyza* spp).

Dozat: 60-75 ml/dynym (max) dhe me 1-2 m³ ujë/dynym.

Nëpërmjet ujitjes me pika nga shfaqja e gjethes së 2^{-të} në kërcellin kryesor deri sa frutat të marrin ngjyrën tipike të pjekjes për varietetin e tyre (BBCH 12-89). Një trajtim çdo 3 vjet.

5. SASIA E AMBALAZHIMIT PËR IMPORTIM:

100ml,200ml,250ml,500ml,1L,5L,10L,20L

6.VËREJTJE:

1. Në të njëjtin sezon kultivimi, mund të përdorni produktin ose me spërkatje gjethore ose me ujitje me pika (jo dhe me të dy mënyrat e trajtimit).
2. Mos e tejkaloni numrin maksimal të lejuar të trajtimeve, (çdo 2 ose 3 vjet), siç përcaktohet për çdo kulturë bujqësore e mënyrë trajtimi.
3. Produkti ka veprim plotësues kundër viruseve në kulturat perimore përmes kontrollit të insekteve që mbartin viruset dhe aktivizimit të mekanizmave natyralë të mbrojtjes së bimëve (SAR).
4. Produkti mund të përfshihet në programet e menaxhimit të integruar të dëmtuesve (IPM).
5. Vëllimi i vogël i tretësirës spërkatëse duhet të përdoret gjatë fazave të para të rritjes e të zhvillimit të kulturave bujqësore dhe vëllimi i madh gjatë fazave të fundit.
Nuk është fitotoksik kur përdoret në dozat dhe në kulturat e rekomanduara.

7. KARENCA:

Spërkatje gjethore: Marule (FH), Domate (S), Patlixhan (S), Kungull (S), Pjepër (S), Shalqi (S): 3 ditë.

Nëpërmjet ujitjes me pika: Marule (FH), Domate (S), Patlixhan (S), Spec (S), Kungull (S), Pjepër (S), Shalqi (S), Kastravec (S): 14 ditë. Punëtorët mund të hyjnë në parcelën e trajtuar 3 ditë pas spërkatjes gjethore

8. PROPOZIMI I KLASIFIKIMIT:



GHS07- ngacmues, irritues (cat 2 ose 3)



GHS09- paralajmërim -i rrezikshëm për ambient.

9. VENDI I SHITJËS: Në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

10. Produkti për mbrojtjen e bimëve i autorizuar nga pika 1 e këtij vendimi lejohet të importohet në Republikën e Kosovës, deri në afatin siç është përcaktuar në certifikatën e regjistrimit, duke u bazuar në Databazën e Pesticideve të BE-se/Substancave aktive, ndërsa qarkullimi dhe përdorimi i tij lejohet sipas nenit 26 paragrafi 3 i Ligjit Nr.03/L-042 i Produkteve për Mbrojtjen e bimëve.

11. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Vendimi i dërgohet:

- Komisioni për vlerësimin dhe autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve;
- Shërbimi kufitar fitosanitar;
- Inspektorët fitosanitar AUV;
- Importuesit të produkteve për mbrojtjen e bimëve;
- Arkivit.



Faton Peci

Ministër



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLICA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO		
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO		
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL		
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA		
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT		
Arhiv - Depozit: Centralno Arhivo - Central Archive		
Nr./Br./No.	1494	
Nr. i fq./Br. Str./No. pg.	3+3+3	
Data/Datum/Date	07.04.2023	
PRISHTINË - PRISTINA - PRISTINA		

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Date: 06.04.2023

Ref. KM-146/23

Pursuant to Article 145 (paragraph 2) of the Constitution of the Republic of Kosovo, taking into account articles 8, 9, 10 and 11 of the Law No. 06/L – 113 on the Organization and Functioning of State Administration of the Independent Agencies, (Official Gazette, No. 7/01 March 2019), based on Article 8 (paragraph 1.4) article 15, Annex 11 of the Regulation (GRK) – No. 02/2021 on the Areas of the Administrative Responsibilities of the Prime Minister's Office and the Ministries (30.03.2021), and Article 20 (paragraphs 1,4 and 5) of the Law No. 03/L – 042 of the Plant Protection Products (Official Gazette No. 44, date 22.12.2008) as well as based on recommendation of the Commission on assessment and authorization of the Plant Protection Products, with Ref. 04-207/23, of the date 28.03.2023, Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, issues the following:

DECISION

On the Inclusion in the register and permitting the authorization to use plant protection product

1. The import, placement in the market and the authorization to use plant protection product – **Minecto Alpha 10/1.25 SC** of producer “**Syngenta Crop Protection AG**”, Switzerland “**Fitofarma**” SH.P.K, Ferizaj shall be permitted.

2. TYPE OF PRODUCT: Insecticide

3. CONTENT OF ACTIVE SUBSTANCE: Cyantraniliprole.....100g/l
Acibenzolar-S-Methyl.....12.5gr/l

4. USE:

Lettuce (FH):

a) For the control of frankliniella occidentalis with a dose of 100 ml/dynym (max) or 100 ml/100 liters of water.

Foliar spray from the appearance of the 2nd true leaf until the heads reach their typical size (BBCH 12-49). One treatment every 2 years.

b) For the control of spodoptera sp. with a dose of 75 ml/dynym (max) or 75 ml/100 liters of water. **Foliar spray** from the appearance of the 2nd true leaf until the heads reach their typical size (BBCH 12-49). One treatment every 2 years.

c) For the control of *frankliniella occidentalis*, and *spodoptera* sp. with a dose of 100 ml/dynam (max) and with 1-2 m³ of water/dynam. Through drip irrigation from the appearance of the 2nd true leaf, until the heads reach their typical size (BBCH 12-49). One treatment every 3 years.

Tomato (S), Eggplant (S): For the control of *frankliniella occidentalis*, *bemisia tabaci*, *trialeurodes vaporariorum*, *spodoptera exigua*, *spodoptera litoralis*, *heliiothis armigera*, *tuta absoluta*, *liriomyza* spp.
Doses: a) 100 ml/dynam (max) or 100 ml/100 liters of water. **Foliar spray** from the appearance of 9 or more leaves on the main stem until the fruits acquire the typical ripening color of their variety (BBCH 20-89). One treatment per year.

b) with a dose of 60-75 ml/dynam (max) and with 1-2 m³ of water/dynam. Through drip irrigation from the appearance of the 2nd leaf on the main stem until the fruits acquire the typical ripening color of their variety (BBCH 12-89). One treatment every 3 years.

Pumpkin (S), Melon (S), Watermelon (S): For the control of *frankliniella occidentalis*, *bemisia tabaci*, *trialeurodes vaporariorum*, *spodoptera exigua*, *spodoptera litoralis*, *heliiothis armigera*, *Aphis gossypii*.

Doses: 100 ml/dynam (max) or 100 ml/100 liters of water.

Foliar spray from the appearance of 9 or more leaves on the main stem until the fruits reach typical harvest size / typical ripening color for their variety (BBCH 20-89). One treatment per year.

Pumpkin (S), Melon (S), Watermelon (S), Cucumber (S): For the control of *frankliniella occidentalis*, *bemisia tabaci*, *trialeurodes vaporariorum*, *spodoptera exigua*, *spodoptera litoralis*, *heliiothis armigera*, *aphis gossypii*.

Doses: 60-75 ml/dynam (max) and with 1-2 m³ of water/dynam.

Through drip irrigation from the appearance of the 2nd true leaf on the main stem until the fruits reach the typical harvest size / typical ripening color for their variety (BBCH 12-89). One treatment every 3 years.

Pepper (S): For the control of *frankliniella occidentalis*, *bemisia tabaci*, *trialeurodes vaporariorum*, *spodoptera exigua*, *spodoptera litoralis*, *heliiothis armigera*, *liriomyza* spp.

Doses: 60-75 ml/dynam (max) and with 1-2 m³ of water/dynam.

Through drip irrigation from the appearance of the 2nd leaf on the main stem until the fruits acquire the typical ripening color of their variety (BBCH 12-89). One treatment every 3 years.

5. PACKING QUANTITY FOR IMPORT:

100ml,200ml,250ml,500ml,1L,5L,10L,20L

6.REMARK:

1. In the same growing season, you can use the product with either foliar spray or drip irrigation (not both treatment methods).
 2. Do not exceed the maximum allowed number of treatments (every 2 or 3 years), as determined for each crop and treatment method.
 3. The product has complementary action against viruses in vegetable crops through the control of virus-carrying insects and the activation of natural plant defense mechanisms (SAR).
 4. The product can be included in integrated pest management (IPM) programs.
 5. The small volume of the spraying solution should be used during the first stages of growth and development of agricultural crops and the large volume during the last stages.
- It is not phytotoxic when used in recommended doses and crops.

7. KARENCA:

Foliar spray: Lettuce (FH), Tomato (S), Eggplant (S), Pumpkin (S), Melon (S), Watermelon (S): 3 days.

Through drip irrigation: Lettuce (FH), Tomato (S), Eggplant (S), Pepper (S), Pumpkin (S), Melon (S), Watermelon (S), Cucumber (S): 14 days. Workers can enter the treated plot 3 days after foliar spraying.

8. PROPOSAL OF CLASSIFICATION:



GHS07- irritant (cat 2 or 3)



GHS09-warning (cat 1) – environmental hazard

9. PLACE OF SELLING: In the whole territory of the Republic of Kosovo.

10. The plant protection product authorized by point 1 of this decision is allowed to be imported into the Republic of Kosovo, until the deadline as defined in the registration certificate, based on the EU Pesticides/Active Substances Database, while circulation and its use is allowed according to article 26 paragraph 3 of Law No. 03/L-042 of Plant Protection Products.

11. This decision shall enter into force on the day of signature.



Faton Peci

Minister

The Decision shall be sent to the following:

- *Commission on assessment and authorization of plant protection products;*
- *Department of Agriculture Policy and Trade;*
- *Phytosanitary boundary service;*
- *Phytosanitary inspectors VFA;*
- *Importers of plant protection products, and*
- *Archive*



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Kabineti i Ministrit / Kabinet Ministra / Cabinet of the Minister

Datum: 06.04.2023

Ref. KM-146/23

U prilog članu 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir članove 8, 9, 10 i 11 Zakona br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, (Službeni list, br. 7/01.03.2019), na osnovu člana 8 (stav 1.4) člana 15, Dodatak 11 Uredbe (VRK)-br.02/2021 za oblasti administrativne odgovornosti kabineta premijera i ministarstava (30.03.2021), i člana 20 (stav 1, 4 i 5) Zakona br. 03/L-042 o sredstvima za zaštitu bilja (Službeni list br.44 od 22.12.2008) kao i na osnovu preporuke Komisije za ocenjivanje i ovlašćenje sredstava za zaštitu bilja, sa Ref.04-207/23, od datuma 28.03.2023, Ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja izdaje:

ODLUKA

Za uvođenje u registar i dozvolu ovlašćenja proizvoda za zaštitu bilja za upotrebu

1. **Dozvoljava se uvoz, plasiranje na tržište i korišćenje ovlašćenje proizvoda za zaštitu bilja – Minecto Alpha 10/1.25 SC proizvođača “Syngenta Crop Protection AG”, Švajcarska od svog predstavnika “Fitofarma” D.O.O, Uroševac.**

2. **TIP PROIZVODA:** Insekticid

3. **SADRŽAJ AKTIVNE SUBSTANCE:** Cyantraniliprole.....100g/l
Acibenzolar-S-Methyl.....12.5gr/l

4. UPOTREBA:

Marule-zelena salata (FH):

a) Za suzbijanje tripsa (*Frankliniella occidentalis*) sa dozom od 100 ml/dinim (mak) ili 100 ml/100 litara vode. **Folijarno prskati** od pojave 2. pravog lista dok glavice ne dostignu svoju tipičnu veličinu (BBCH 12-49). Jedan tretman svake 2 godine.

b) Za suzbijanje lepidoptera (*Spodoptera sp.*) dozom od 75 ml/dinim (mak) ili 75 ml/100 litara vode. **Folijarno prskati** od pojave 2. pravog lista dok glavice ne dostignu svoju tipičnu veličinu (BBCH 12-49). Jedan tretman svake 2 godine.

c) Za suzbijanje tripsa (*Frankliniella occidentalis*), i lepidoptera (*Spodoptera sp.*) sa dozom od 100 ml/dinim (mak) i sa 1-2 m3 vode/dinim. **Navodnjavanjem kap po kap** od pojave 2. pravog lista, dok glavice ne dostignu svoju tipičnu veličinu (BBCH 12-49). Jedan tretman svake 3 godine.

Paradajz (S), Patlidžan (S): Za suzbijanje tripsa (*Frankliniella occidentalis*), tripsa (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), Lepidoptera (*Spodoptera ekigua*, *Spodoptera litoralis*, *Heliothis armigera*), Tuta (*Tuta absoluta*), Liriomizami spp).

Doze: a) 100 ml/dinim (mak) ili 100 ml/100 litara vode. **Folijarno prskati** od pojave 9 ili više listova na glavnoj stabljici dok plodovi ne dobiju tipičnu boju zrenja za svoju sortu (BBCH 20-89). Jedan tretman godišnje.

b) sa dozom od 60-75 ml/dinam (mak) i sa 1-2 m³ vode/dinam. **Navodnjavanjem kap po kap** od pojave 2. lista na glavnoj stabljici dok plodovi ne dobiju tipičnu boju zrenja za svoju sortu (BBCH 12-89). Jedan tretman svake 3 godine.

Bundeva (S), Dinja (S), Lubenica (S): Za suzbijanje tripsa (*Frankliniella occidentalis*), tripsa (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), Lepidoptera (*Spodoptera ekigua*, *Spodoptera litoralis*, *Heliothis armigera*), vaški (*Aphis gossipii*).

Doze: 100 ml/dinim (mak) ili 100 ml/100 litara vode.

Folijarno prskati od pojave 9 ili više listova na glavnoj stabljici dok plodovi ne dostignu tipičnu veličinu berbe / tipičnu boju zrenja za svoju sortu (BBCH 20-89). Jedan tretman godišnje.

Bundeva (S), Dinja (S), Lubenica (S), Krastavac (S): Za suzbijanje tripsa (*Frankliniella occidentalis*), tripsa (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), Lepidoptera (*Spodoptera ekigua*, *Spodoptera litoralis*, *Heliothis armigera*), vaške (*Aphis gossipii*).

Doze: 60-75 ml/dinam (mak) i sa 1-2 m³ vode/dinam.

Navodnjavanjem kap po kap od pojave 2. pravog lista na glavnoj stabljici dok plodovi ne dostignu tipičnu veličinu berbe / tipičnu boju zrenja za svoju sortu (BBCH 12-89). Jedan tretman svake 3 godine.

Paprika(S): Za suzbijanje tripsa (*Frankliniella occidentalis*), tripsa (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), Lepidoptera (*Spodoptera ekigua*, *Spodoptera litoralis*, *Heliothis armigera*), Liriomiza (*Liriomiza* spp).

Doze: 60-75 ml/dinam (mak) i sa 1-2 m³ vode/dinam.

Navodnjavanjem kap po kap od pojave 2. lista na glavnoj stabljici dok plodovi ne dobiju tipičnu boju zrenja za svoju sortu (BBCH 12-89). Jedan tretman svake 3 godine.

5. KOLIČINA AMBALAŽA ZA UVOZ:

100ml,200ml,250ml,500ml,1L,5L,10L,20L

6. NAPOMENA:


1. U istoj vegetacijskoj sezoni, proizvod možete koristiti ili sa folijarnim prskanjem ili navodnjavanjem kap po kap (ne oba načina tretmana).
2. Ne prekoračiti maksimalno dozvoljeni broj tretmana (svake 2 ili 3 godine), koji je određen za svaki usev i metod tretmana.
3. Proizvod ima komplementarno dejstvo protiv virusa u povrtarskim kulturama kroz kontrolu insekata nosilaca virusa i aktiviranje prirodnih odbrambenih mehanizama biljaka (SAR).
4. Proizvod može biti uključen u programe integrisanog upravljanja štetočinama (IPM).
5. Mala zapremina rastvora za prskanje treba da se koristi u prvim fazama rasta i razvoja poljoprivrednih useva, a velika u poslednjim fazama.
Nije fitotoksičan kada se koristi u preporučenim dozama i useva.

7. KARENCA:

Folijarno-lisno prskanje: zelena salata (FH), paradajz (S), patlidžan (S), bundeva (S), dinja (S), lubenica (S): 3 dana.

Navodnjavanjem kap po kap: zelena salata (FH), paradajz (S), patlidžan (S), paprika (S), bundeva (S), dinja (S), Lubenica (S), Krastavac (S): 14 dana. Radnici mogu da uđu na tretiranu parcelu 3 dana nakon folijarnog prskanja

8. PREDLOG KLASIFIKACIJE:



GHS09- upozorenje (cat 1) - ekološki opasan

9. MESTO PRODAJE:

Na celoj teritoriji Republike Kosovo.

10. Sredstvo za zaštitu bilja odobreno tačkom 1. ove odluke je dozvoljeno za uvoz u Republiku Kosovo, do roka definisanog u sertifikatu o registraciji, na osnovu baze podataka o pesticidima/aktivnim supstancama EU/a, dok je njegov promet i upotreba dozvoljeno prema članu 26 stav 3 Zakona br. 03/L-042 o sredstvima za zaštitu bilja.

11. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Odluka se šalje:

- *Komisija za procenu i odobrenje preparata za zaštitu bilja;*
- *Departament Poljoprivrednih Politika i Tržišta;*
- *Fitosanitarna granična služba;*
- *Fitosanitarni inspektori AHV;*
- *Uvozniku sredstava za zaštitu bilja;*
- *Arhiva.*



Faton Peci

Ministar